


Cómo Usar Naloxona

1. Retire el aerosol nasal de la caja
2. Abra el empaque
3. Sostenga el aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo y los dedos índice y medio a cada lado de la boquilla.
4. Inserte la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales
5. Presione el émbolo firmemente para administrar la dosis.
6. Si no hay reacción en 2-3 minutos o la persona deja de respirar nuevamente, administre la segunda dosis en OTRA fosa nasal usando un dispositivo nuevo



Permanece con la persona. Naloxona pierde su efecto en 30-60 minutos y los síntomas pueden reaparecer.

¡TU puedes salvar una vida!



**Substance Abuse
Coalition Leaders
of Arizona**

Cómo Responder a una Sobredosis

¿Cómo se mira una sobredosis?

Pérdida de Consciencia

Poco Profundo/Sin respiración

Sonido de Gorgoteo

Piel Fría Pálida/Azul

Pupilas Pequeñas "puntiagudas"

SIN respuesta a la estimulación



Si piensas que tienen una sobredosis

Pregunta EN VOZ ALTA:

"¿Estás bien?"

Sacudir su hombro

**Realizar un masaje en el
esternón**

Controlar la respiración

Administrar Naloxona

Iniciar RCP

Llama al 9-1-1

Estás cubierto por la Ley del Buen Samaritano siempre que actúes de buena fe y no por ninguna consideración monetaria

La Ley del Buen Samaritano proporciona inmunidad contra el arresto, por posesión de ciertas sustancias controladas y parafernalia en pequeñas cantidades específicas cuando una persona llama al 911 para solicitar asistencia en caso de una sobredosis.